

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

MITOMYCIN-C-BEHANDLING AV URINBLÅSAN

Mitomycin-C är cytostatika som används för att behandla ytlig urinblåsecancer. Cytostatika är starka mediciner, men deras effekt är märkbart mindre då man ger dem i blåsan jämfört med att ge dem via blodomloppet. Behandlingen ges vanligtvis varje vecka under sex veckors tid.

Förberedelser inför behandlingen

- För ett urinprov till hälsovårdscentralen tre dagar före varje behandling. Ifall det finns en infektion i urinen blir du kontaktad från sjukhuset. Vid behov vårdas infektionen med antibiotika innan behandlingen fortsätter.
- Du får salttabletter från sjukhuset som tas enligt följande:
 - föregående kväll tas 1,5 gram salttabletter
 - på dagen för behandlingen tas 1,5 g salttabletter 30 minuter före behandlingen.
- Drink inget 8 timmar före och 2 timmar efter behandlingen.
- Du får äta normalt på morgonen.
- Du får ta dina morgonmediciner som normalt, ta eventuella vätskedrivande mediciner först efter behandlingen.

Genomförandet av behandlingen

Urinblåsan töms före behandlingen med hjälp av en urinkateter, samma kateter används för att sätta in medicinen i blåsan. Åtgärden räcker några minuter, därefter avlägsnas katetern. Medicinen skall vara i urinblåsan två timmar. Under tiden är det bra att röra på sig och byta ställning. På så sätt säkerställs medicinens spridning till alla delar av urinblåsan.

Efter behandlingen

- Efter 2 timmar får du urinera som vanligt.
- Behandlingen kan orsaka:
 - ökat behov att urinera eller blodig urin
 - sveda i urinröret och hudirritation runt könsorganen
- Drink rikligt efter första urineringen, så att urinvägarna sköljs.
- Du kan ta värkmedicin vid behov.
- För att det inte skall bli kvar medicin på huden är det speciellt viktigt att tvätta händerna och könsorganen varje gång du urinerat 2 dygn efter behandlingen. Efter toalettbesök skall WC-byttan sköljas två gånger med locket stängt. För att undvika stänk rekommenderas att även män sitter ner och urinerar.
- Använd kondom för att skydda din partner eller avstå från att ha samlag under en veckas tid efter varje behandling.

Kontakta den vårdande enheten eller juren ifall;

- Du får över 38°C feber
- Ditt allmäntillstånd försvagas. Berätta alltid om behandlingen, för symptomen kan vara biverkningar av medicinen eller tecken på infektion.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.