

## Acitretin (Neotigason®)

Den aktiva substansen i Neotigason® är acitretin som är A-vitaminerivat och som hör till läkemedelsgruppen retinoider. Acitretin bromsar upp hudcellernas snabba nybildande och keratinisering, som är kännetecknande för psoriasisjukdomar.

### Användning

- Resultaten av behandlingen syns inte omedelbart. I det initiala skedet kan det förekomma akut förvärring av sjukdomen, vilken i allmänhet lugnar sig efter 2–3 veckor.
- En normal dos är 25–50 mg en gång per dag, men även lägre doser kan användas. Doseringen överstiger i allmänhet inte 75 mg.
- Doseringen kan ändras under behandlingens gång och den anpassas bland annat i enlighet med symtomens svårighetsgrad och patientens individuella egenskaper. Hur länge vårdperioden varar beror på behandlingsresultatet och de eventuella oönskade effekterna. **Använd alltid läkemedlet enligt läkarens ordination.**

### Administreringsätt

- Du ska ta kapslarna med en riklig mängd vätska en gång per dag i samband med måltid eller tillsammans med mjölk.
- Kvinnor i fertil ålder ska inleda medicineringen på den andra eller tredje dagen under en normal menstruation.
- Förekomsten av oönskade effekter beror i allmänhet på doseringen och deras intensitet varierar från person till person. Du ska berätta för din behandlande läkare om de oönskade effekterna är svåra.

### Graviditet och amning

- Neotigason® **skadar fostret allvarligt**. Du får inte vara gravid eller bli gravid under behandlingen eller inom tre år efter avslutad behandling.
- **Du måste använda effektiva preventivmedel under hela behandlingstiden.** Du måste använda preventivmedel i minst fyra veckor innan behandlingen inleds och sedan fortsätta med dem i tre år efter avslutad behandling.
- Retinoidhalten i sädesvätskan hos män som använder Neotigason® -preparatet är så låg att den inte skadar fostret.
- Patienten får inte amma under medicineringen.

## Oönskade effekter

- Torrhet i slemhinnor, torra ögon och torr hud samt näsblödningar orsakade av torrhet i slemhinnorna i näsan.
- Muntorrhet och törst.
- Spruckna läpparna.
- Nedsatt mörkerseende.
- Förhöjda lever- och fettvärden.
- Muskel- och ledvärk.
- Huvudvärk.
- Förändringar i sinnesstämningen, bland annat depression.
- Ökat håravfall, sköra naglar och nagelbandsinfektioner.

## Uppföljning

- Lever- och fettvärdena följs upp med regelbundna blodprov före behandlingen inleds och under behandlingens gång.
- Ditt graviditetstest måste vara negativt före behandlingen inleds och efter att den har avslutats. Vid behov kontroll av graviditetstest varje månad.
- **Att du går på blodprov är en förutsättning för att ditt recept förnyas.**

## Att beakta

- **Du får inte donera blod** under behandlingen och inte heller i två år efter att behandlingen avslutats.
- Medicinen **ökar känsligheten för solljus**, så du ska undvika överdriven vistelse i solljus. I samband med möjlig exponering rekommenderas det att du använder solkräm.
- Använd återfuktande emulsionskräm och läppbalsam. Undvik att använda preparat med peeling-effekt och hårborttagning med vax.
- **Låt aldrig någon annan använda detta läkemedel.** Det kan skada gravida kvinnors foster eller orsaka allvarliga hälsoproblem för användaren. Dina överblivna läkemedel ska du föra till apoteket för förstöring.
- **Alkohol** ökar risken för oönskade effekter.

## Neotigason® och andra läkemedel

- Beträffande preventivmedel rekommenderas det att du inte använder ett sådant som innehåller enbart progesteron, dvs. "minipiller", under Neotigason® –behandlingen, eftersom Neotigason® kan försvaga dess effekt.
- Undvik att använda preparat som innehåller A-vitamin, andra retinoider, metotrexat och tetracykliner under Neotigason® –behandlingen.
- Neotigason® kan förändra effekten av fenytoin (epilepsimedicin).