

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

OSCILLOMETRIUNDERSÖKNING

Ert barn har reserverats tid till en oscillometriundersökning. I undersökningen mäts bl.a. strömningsmotsånd i luftvägarna, alltså hur enkelt luft rör sig till och från lungorna. Dessutom avgörs hur medicin som öppnar luftvägarna påverkar lungornas funktion.

Mätningarna utförs i sittande läge. Barnet andas i normal, lugn takt i ett munstycke i flera 30 sekunders intervaller. Kinderna stöds under mätningarna och näsan knips fast för att hindra andning genom näsan. Efter de första mätningarna ges barnet medicin som öppnar luftvägarna och nya mätningar utförs om 10-15 minuter. För hela undersökningen bör man reservera ca 1 timme. **Berätta för barnet i förväg vad som sker i undersökningen!**

Ifall undersökningen görs för att bekräfta en diagnos bör man avstå ifrån medicinering som öppnar luftvägarna 12 timmar före mätningarna (Airomir, Buventol, Ventilastin, Ventoline). Långtidsverkande luftvägsmedicinering bör man avstå ifrån 24 timmar före testet (t.ex. Oxis, Serevent). Regelbundet tagen astmamedicin (Asmanex, Beclomet, Bufomix, Flixotide, Novopulmon, Pulmicort, Relvar, Seretide, Symbicort) bör man avstå ifrån fyra veckor före testet, om man inte kommit överens med läkaren att medicineringen kan användas normalt.

Ifall ert barn plötsligt insjuknat i en inflammatorisk sjukdom, var god och kontakta underskrivna för att boka en ny tid.

sjuksköterska

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.