

# EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

## PERICARDIOMPUNKTION OCH DRENÄRING

Av olika orsaker kan det samlas en varierande mängd vätska i hjärtsäcken. Detta konstateras med ultraljudsundersökning av hjärtat. Vätskan försvinner oftast av sig själv. Ibland är det dock nödvändigt att ta ett prov från hjärtsäcken för att reda ut orsaken till vätskan (bakterie-, svamp- tuberkulos- och cellprover), eller om det inverkar på hjärtats funktion (tamponation).

Åtgärden görs i lokalbedövning med hjälp av ultraljud. Patienten ligger i halvsittande ställning i sin säng. Med hjälp av en punktionsnål för man en kateter in i hjärtsäcken genom vilken man får de prover som behövs. Vätskan i hjärtsäcken rinner av sig självt via katetern i en påse. Katetern avlägsnas vanligtvis följande dag på avdelningen.

Efter åtgärden observeras ditt tillstånd på sjukhus.

Åtgärden är inte helt ofarlig, men de allvarliga komplikationerna är sällsynta.

Kardiologen gör en ultraljudsundersökning av hjärtat före- och efter åtgärden samt innan hemfärd och ger anvisningar för fortsatt vård.

Sydänsairaudet.fi

Tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisyä.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • [www.vsshp.fi/sv](http://www.vsshp.fi/sv) • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.