

SLT-laserbehandling

Du har fått en tid för SLT (selektiv lasertrabekuloplasti). SLT görs p.g.a. att man har för högt ögontryck. Under åtgärden ger man laserljus i kammarvinkeln. Kammarvinkeln är området mellan iris (regnbågshinna) och cornea (hornhinna), där kammarvätskan filtreras. Syftet med SLT är att förbättra kammarvätskans cirkulation och därmed sänka trycket.

Laserbehandling

Vid ankomst får du ögondroppar som gör pupillen mindre. Dropparna kan orsaka huvudvärk, men detta är ofarligt och kan skötas med vanlig smärtstillande medicin, t ex. Panadol. Själva åtgärden tar ungefär 10-20 minuter. Du får en bedövningsdroppe i ögat, varefter en liten lins sätts mot ögat och laserbehandlingen ges via linsen. Under behandlingen ger läkaren anvisningar, vart du skall rikta blicken. Följ då bara läkarens instruktioner. Under laserbehandlingen blinkar laserljuset och det hörs knäppande ljud, men du känner ingen smärta. Efter behandlingen får du fara hem direkt.

Efterbehandling

Ingen efterbehandling behövs, och alla mediciner fortsätter som vanligt, även ögontrycksmediciner. Ögat kan kännas irriterat under behandlingsdagen. Inga begränsningar angående till exempel ansiktstvätt eller ansträngning finns. Om din ögontryckssjukdom redan uppföljs hos oss, kommer du för återbesök till Åucs (Tyks) om cirka 3 månader. Annars rekommenderar vi efterkontroll hos remitterande ögonläkaren.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.