

## Skleroterapi av sköldkörteln

Ni har bokats en tid till behandling av en godartad förändring (cysta eller knöl) i sköldkörteln. Åtgärden görs med hjälp av ultraljud.

### Hur förbereder Ni er till åtgärden?

- Var god och kontakta den vårdande polikliniken snarast möjligt ifall Ni använder läkemedel som påverkar blodets koagulation (Marevan, Plavix, Eliquis, Xarelto). Kontakta polikliniken även om Ni är överkänslig mot bedövningsmedel.
- För åtgärden kan Ni även vara ordinerad blodprov. Dessa måste tas dagen innan åtgärden.
- På åtgärdsdagen bör Ni vara oäten och odrucken 4 timmar före åtgärden. Den regelbundna medicineringen kan ni ta normalt.
- Smycken och klockor måste tas bort före Ni kommer till åtgärden.

### Hur utförs åtgärden?

- Åtgärden utförs under lokalbedövning.
- Åtgärden tar 30 min – 1 timme.
- En intravenös kanyl sätts för eventuell medicinering.
- En nål förs till behandlingsområdet i sköldkörteln med hjälp av ultraljud. Röntgenstrålar används ej.
- Om den behandlade förändringen är vätskefylld töms den av vätska innan sprutandet av behandlingsmedlet.
- Medlet som används består oftast av etanol.
- Provbitar eller cellprov tas inte rutinmässigt i samband med skleroterapi.

### Var händer efter åtgärden?

- Efter åtgärden övervakas Ni i ca 30 minuter på åtgärdsenheten varefter Ni kan åka hem. Var dock förberedd att övervakningstiden kan vara längre (t.ex. 2-3 timmar). Detta görs om Ert tillstånd så kräver eller om ni fått stark smärtstillande medicinering under åtgärden.
- Efter åtgärden får Ni äta och dricka normalt ifall ni inte har andra begränsningar.
- Oftast uppnås en önskad effect med en behandling. Större förändringar kan kräva flera behandlingsgångar.

## **Hur hör ni om resultaten?**

Den remitterande polikliniken eller avdelningen informerar Er om åtgärdsresultaten.