

## Skleroterapi

Det har reserverats tid till Er för behandling av missbildning i ett blodkärl. Eftersom åtgärden kräver såväl förberedelser som eftervård har det även reserverats plats till Er på bäddavdelningen.

### Vad är skleroterapi?

Ni har konstaterats ha en missbildning i ett blodkärl. Missbildningen behandlas med hjälp av en metod som kallas skleroterapi. I blodkärlet injiceras läkemedel som förminskar missbildningen. De vanligaste missbildningar som behandlas med skleroterapi är missbildningar i vener eller i lymfkärl.

### Hur förbereder Ni Er för undersökningen?

- Ni kommer till sjukhuset, enligt instruktioner från avdelningen, dagen före undersökningen eller på undersökningsdagens morgon.
- P. g. a åtgärden tas eventuellt blodprov.
- Ni skall inte äta eller dricka 4 timmar före åtgärden. Ni kan ta ordinerade mediciner.
- Smycken och klockor måste tas bort före Ni kommer till åtgärden.

### Hur går åtgärden till?

Åtgärden utförs under bedövning eller under nedsövning. Anestesimetoden beror på vad som skall behandlas.

I det område som skall behandlas införs, med hjälp av ultraljud eller genomlysning, en nål.

Först avbildas objektet med kontrastmedel. Efter det injiceras skleroterapi-medel, via samma nål, till det område som skall behandlas.

### Efter åtgärden

- Åtgärden tar 1-2 timmar.
- Efter åtgärden kan det behandlade området vara sjukt och svullet i några dagar. Om inte annat ordinerats, kan ni vid behov använda vanliga värkmediciner.
- Om missbildningen är stor, kan det behövas flera behandlingsgångar.
- Om det hos Er uppkommer några besvär efter åtgärden, ta kontakt med den bäddavdelning som vårdat Er.

### Var hör Ni om resultatet av undersökningen?

Den remitterande polikliniken eller avdelningen informerar om åtgärdsresultaten.