

## **Stereotaxi- eller ultraljudsstyrd märkning med korn av bröstkörteln**

I åtgärden markerar man det område som kommer att avlägsnas under operationen med ett korn som skickar radiosignal. Åtgärden kan genomföras stereotaxistyrkt, eller ultraljudstyrkt med en mammografianordning, beroende på var förändringen syns bäst.

### **Hur förbereder du dig inför undersökningen?**

Sätt din eventuella blodförtunnande medicin på paus 2-3 dagar före märkningen, ifall det är möjligt med hänsyn till din primärsjukdom (t.ex. klaffprotes). I dessa fall ska ärendet alltid diskuteras med den behandlande läkaren. Även omega-3-preparat som du eventuellt använder ska sättas på paus 10 dagar före åtgärden. Åtgärden kräver inga andra förberedelser.

### **Hur genomförs undersökningen?**

Märkningsstället bedövas alltid före åtgärden. Vid stickstället gör man ett litet hudsår.

Om åtgärden genomförs med en mammografianordning, blir bröstkörteln stadigt pressad under åtgärden och patienten ligger på sidan på en säng. När undersökningen genomförs med ultraljud, ligger patienten på rygg och bröstet pressas inte.

Du ska reservera ca 1,5 timmar tid för åtgärden.

### **Vad händer efter undersökningen?**

Efter åtgärden trycks stickstället med en kylförpackning i minst 10 min. för att undvika blödning. Till slut tas mammografibilder för att säkerställa kornets läge. Efter åtgärden kan bröstkörteln ömma och det kan utvecklas ett blåmärke.

Stickstället ska hållas torrt i 1 dygn.