

## **TRH-test (Pt-TRH-R1 2762, Pt-TRH-R2 2763)**

Undersökningen görs för att utreda utsöndringen av hormoner från hjärnbihanget med hjälp av testämnet TRH.

### **Hur du förbereder dig för undersökningen**

1. Du ska inte äta eller dricka något efter klockan 22:00 kvällen före provet.
2. På morgonen kan du dricka ett glas vatten.

Det finns många mediciner som kan påverka undersökningsresultatet.

1. Tala om för din läkare vilka mediciner du använder. Detta gäller såväl mediciner som du använder regelbundet som sådana mediciner som du använder bara tillfälligt. Din läkare ger dig anvisningar om du bör pausa någon medicin före undersökningen.

### **Utförande**

1. Först sticker en skötare en kanyl in i en ven.
2. Testämnet (TRH) som används i undersökningen ges genom kanylen som ligger inne i venen. Testämnet kan orsaka tillfällig svindel, illamående, hetta i ansiktet, svettningar och förhöjt blodtryck.
3. Också blodproven som tas i samband med undersökningen tas genom venkanylen.
4. När alla prov har tagits, tar skötaren bort kanylen från venen.

Det korta TRH-testet tar en knapp timme. Det långa TRH-testet tar 1½ timme.

I frågor gällande provet ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat provet.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Granskad 25.8.2023 ALP