

Takrolimus- och pimekrolimussalvor

- Takrolimus- och pimekrolimussalvor hör till kalcineurinhämmare som används för behandling av atopiskt eksem.
- Kalcineurinhämmare påverkar speciellt de hudceller som svarar för klåda, rodnad och inflammation i anslutning till atopiskt eksem. De minskar mängden inflammationsmediatorer i huden, dämpar hudinfektionen snabbt och normaliserar hudens skyddande skikt.
- Salvorna kan användas av personer över 2 år som har medelsvårt eller svårt atopiskt eksem, som inte drar tillräcklig nytta av vanliga kortisonsalvor och som har eksem på omfattande hudområden.
- Salvorna kan användas på ansiktets, halsens, hudveckens och ögonlockens områden.
- Vid specialtillfällen kan salvorna användas också på slemhinnor.
- Takrolimussalvans styrkor är 0,03 % och 0,1 % och pimekrolimussalvans styrka är 1 %.

Användning

- Ett tunt lager salva appliceras på eksemområdet vanligtvis två gånger per dag, om läkare inte ordinerar annat.
- Behandlingen pågår en eller två gånger per dag tills eksemet har läkt och symtomen försvunnit.
- Därefter kan du fortsätta behandlingen som underhållsbehandling två gånger i veckan t.ex. i ett par månader eller enligt läkares ordination.
- Behandlingen inleds på nytt när första eksemsymtom uppstår.

Kontraindikationer

- Använd inte salvan om det förekommer en aktiv virus- eller bakterieinfektion, t.ex. herpes simplex, vattkoppor eller varig bakterieinfektion på huden. Behandlingen kan påbörjas på nytt först när infektionen har behandlats eller den har gått över spontant.
- Undvik solljus, UV-ljusbehandlingar och solarium under behandlingen.
- Om salvorna används på sommaren, ska huden skyddas mot sol genom att använda solkräm med hög solskyddsfaktor (solskyddsfaktor 50), och huden ska också skyddas med kläder.
- Under sommaren appliceras salvorna på huden på kvällen, och följande morgon appliceras solkräm på det smörjda hudområdet.
- Under resor till södern och även under ljusbehandlingsperioder ska användningen av salvorna sättas på paus.

- Hudområdet som har behandlats med salvan får inte täckas med förband.

Eventuella biverkningar

- Den vanligaste biverkningen av takrolimus- och pimekrolimussalvorna är lindrig och kortvarig brännande känsla och värmekänsla på det ställe där salvan har applicerats. Också irritation, klåda, rodnad och follikelinflammation kan förekomma på det behandlade hudområdet. Symtomen förekommer vid behandlingens första skede och de är lindriga och kortvariga.
- Även mindre alkoholbruk kan orsaka rodnad på de behandlade hudområdena, men fenomenet är kortvarigt och ofarligt.

Ersättning

- Rätt till grundersättning: Med ett B-utlåtande utfärdat av specialistläkare i hudsjukdomar eller i barnsjukdomar vid atopiskt eksem. Inget rätt till grundersättning vid övriga eksem.
- Även läkare i allmänmedicin kan ordinera salvorna utan rätt till grundersättning.

Hur salvan ska förvaras

- Salvan förvaras i rumstemperatur vid högst 25 °C. Salvan får inte frysas.