

Ultraljudsundersökning och biopsi av prostata

Med hjälp av ultraljud och eventuella vävnadsprov undersöks prostatans situation.

Att beakta före undersökningen

Kontakta den vårdande enheten i god tid före den bokade tiden till mottagningen ifall du använder medicin som påverkar blodets koagulering och du inte har fått anvisningar angående användningen av den.

Undersökningen

Ultraljudsundersökningen görs via ändtarmsöppningen med hjälp av ultraljudssonden. Undersökningens längd är cirka 15 minuter och efter ungefär 30 minuter är du redo att åka hem. Det finns risk för inflammation efter biopsin, för att förhindra detta ges antibiotika i samband med undersökningen. Antibiotikan fortsätter möjligtvis efter undersökningen och då får du skilda anvisningar angående det.

Eventuella symptom efter biopsin

- Efter att man tagit vävnadsproven kan urinen vara blodig en tid. Det är viktigt att dricka mer än normalt (1,5 – 2 liter/dygn) i några dagars tid så att urinens färg klarnar.
- Det kan förekomma blod i avföringen och sädesvätskan kan vara missfärgad (blodig eller brunaktig) några veckor.

Värkmedicin efter biopsin

- Vid behov kan du använda receptfria värkmediciner såsom Burana® eller Paratabs®.

Kontakta den vårdande enheten eller juren ifall du har följande symptom:

- riklig blödning
- urineringen lyckas inte
- ständig värk i nedre delen av buken
- du får plötsligt hög feber

Eftervård

Resultaten av vävnadsproven påverkar eftervården. På mottagningen överenskoms ifall läkaren ringer angående provsvaren eller skickas de hem per post. Ifall provbitarna visar att det finns sjukdom hålls ett vårdmöte där man tillsammans kommer överens angående eftervården.

Kontakta den vårdande enheten ifall du har frågor.