

Undersökning eller åtgärd som genomförs i generell anestesi

Ditt barn ska komma till en undersökning eller en åtgärd som kräver generell anestesi.

Förberedelser inför undersökningen

På grund av anestesi ska barnet vara utan näring före undersökningen. Att vara utan näring hindrar barnet från att kräkas under anestesi. **Undersökningen kan inte genomföras under generell anestesi, om barnet inte har varit utan näring.**

- På åtgärds morgonen **får barnet inte äta**. Modersmjölk och modersmjölkersättning kan ges senast fyra timmar före ankomsten till sjukhuset.
- Hemma får barnet dricka vatten eller klar saft högst 2 dl tills det är en timme kvar till ankomsten till sjukhuset.
- Hemma på morgonen kan barnet ta sina regelbundna mediciner med vatten eller klar saft.
- Multivitamin- och spårämnespreparat får barnet inte ta på undersökningsmorgonen, om det inte är absolut nödvändigt.
- Om barnet blir sjukt eller om ni behöver ytterligare information om undersökningsdagen, vänligen ta kontakt med enheten som ansvarar för vården.
- **Ni får ett textmeddelande/telefonsamtal om ankomsttiden till sjukhuset dagen före undersökningen.**

Undersökningsdagen på sjukhuset

- På avdelningen applicerar man bedövningssalva på barnets arm för kanylering.
- Föräldrarna har möjlighet att följa med barnet till undersöknings- eller åtgärdsavdelningen och stanna vid hens sida fram till hen sövs ner.

Efter undersökningen

Efter barnet vaknat får hen först dricka och sedan äta enligt sitt mående. Efter undersökningen eller åtgärden får barnet ett mellanmål på avdelningen.

Efter undersökningen eller åtgärden skrivs barnet ut enligt hens tillstånd. Under hemresan behöver barnet en följeslagare som inte samtidigt är bilförare.