

## VÅRD AV BARNETS SÅR

Ert barns operationssår har tillslutits med stygn / aggraffer som ska tas bort.

Stygn- / aggraffborttagning \_\_\_\_\_ i barnrådgivningen / hos skolskötaren / i ert hälsovårdscentrum.

### Förband

Såret skall hållas rent och torrt tills det har gått minst 24-48 timmar efter ingreppet. Vissa sår behöver skydd också under en längre tid. Moderna förband bidrar till att sår läks väl.

Håll förbandet som skydd för såret ända tills \_\_\_\_\_ eller tills såret slutar blöda. Ifall förbandet blir smustigt eller blött ska det bytas ut.

### Att blöta såret

Efter att förbandet har tagits bort är det tillåtet att duscha. Undvik att tvätta såret med tvål eller gnugga det. Torka såret noga efter duschen genom att trycka lätt på såret med en ren handduk

Barnet kan bada, bada bastu och simma 2 dagar efter att stygnen tagits bort.

### Sår vid området under blöjan

Man kan genast duscha såret ifall det ligger vid området under blöjan. Sätt blöjan fast löst, så att den inte baddar såret. Det är bra att lyfta / bära barnet genom att stöda under rumpan, för att inte orsaka smärta vid såret eller tänja ut det.

### Motion

Barnet får röra på sig fritt efter ingreppet men i det tidiga skedet ska våldsamma lekar och motion undvikas.

**Motionsförbud** \_\_\_\_\_ veckor / mån, ända till \_\_\_\_\_ .

**Kontakta** den vårdande avdelningen \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ ,  
ifall

- Såret blöder ständigt eller rikligt (blod, vävnadsvätska)
- Det finns inflammationssymtom i såret (ökande smärta, rödhet, svullnad, hettar)
- Såret ustöndrar varigt sekret eller att förbandet börjar lukta
- Barnet har feber (över 38 grader)