

Ohje hoitosuhteessa oleville potilaillemme
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

HEMVÅRDSFÖRESKRIFTER EFTER DRÄNBEHANDLING AV PNEUMOTHORAX

Tvätta händerna noggrant alltid före och efter skötsel av såret. Såret har förslutits med suturer, eller resorberbara suturer.

Borttagning av suturer eller agraffer

- På hälsovårdscentralen eller t.ex. arbetshälsovården ___/___20___. Boka tiden själv.

Ifall såret har förslutits med resorberbara suturer behövs man inte ta bort dom, utan dom försvinner av sig själv inom 2 veckor.

Dusch och sårförband

- Såret och området omkring skall hållas rent. Rör inte såret i onödan.
- Luftät sårförbanden får man ta borta 72 timmar efter man har avlägsnat dränet. Om såret är fuktigt eller det söntrar kan man skydda det med en sårförband man kan köpa till exempel av apoteket. Byta sårförbandet alltid när den har blivit fuktad.
- Du kan duscha med luftät sårförbanden. Du får gå till bastu, simma och bada när såret har läkt. Ifall såret har förslutits med resorberbara suturer får du gå till bastu, simma och bada när suturerna har bröt ner.
- Såret behöver inte skyddas med förband ifall det inte utsöndrar sekret.
- Såret får inte skavas, så du skall undvika användning av åtsittande kläder.

Smärtlindring

- Följ läkarens ordination angående smärtlindring.
- Smärtan kan lindras med receptfria läkemedel enligt anvisningarna på förpackningen.

Ifall det uppstår problem

Ta kontakt med den vårdande enheten, hälsovårdscentralen eller jouden ifall t.ex.

- Symtomerna av pneumothorax återkommer, du har andnöd, torr hosta eller skarp bröstsmärta.
- Såret orsakar tilltagande smärta trots smärtlindring
- Det förekommer svullnad, rodnad eller hetta i området kring såret
- Blödning eller annan utsöndring från såret
- Du får över 38 grader feber