

Ripulin hoito-ohje irinotekaani-syöpälääkehoidon aikana

Saamasi solunsalpaaja irinotekaani voi aiheuttaa ripulia. Tyypillisimmillään ripuli alkaa noin viikon kuluttua hoidosta, mutta se voi alkaa jo vuorokauden sisällä hoidon antamisesta. Ripuli on hoitamattomana vakava haittavaikutus, joten se on pyrittävä hoitamaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Jos saat ripulin, sinun tulee toimia seuraavasti:

Aloita heti ensimmäisen ripuliulosteen jälkeen loperamidilääkehoito (Imodium®, Imocur® tai Lopex®)

Annostus: Ota ensin 2 kapselia tai tablettia. Sen jälkeen 1 kapseli tai tabletti kahden tunnin välein.

Hoitoa tulee jatkaa vielä 12 tuntia viimeisen ripuliulosteen jälkeen, enintään kuitenkin 13 kapselia/tablettia vuorokaudessa. Tällä annoksella loperamidia ei saa käyttää pidempään kuin 48 tuntia. Ota herkästi yhteyttä hoitoyksikköön.

Ripulin aikana sinun tulee juoda runsaasti nestettä ja tarvittaessa apteekin valmisteita (esim. Osmosal Novum®, Floridral®) korvaamaan ja estämään elimistön veden ja suolojen menetystä pakkauksen ohjeen mukaan.

Sinun tulee välittömästi ottaa yhteyttä hoidon antaneeseen yksikköön tai lähteä päivystykseen jos

Ripuli on voimakasta/ tai muuttuu veriseksi.

Yleiskuntosi heikkenee tai tulee kuumetta.

Pahoinvointi tai oksentelu tekee juomisen tai ripulilääkkeen oton mahdottomaksi.